

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	投与間隔
レジメン名	GEM+nab-PTX療法					28日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8.15	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125 mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8.15	
レジメン名	FOLFIRINOX療法					投与間隔 14日
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	
	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	
	イリノテカン	180 mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	全開	day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間	day1-2	
レジメン名	ジェムザール(隔週投与)療法					投与間隔 14日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1	
レジメン名	ジェムザール(3週投与1週休薬)療法					投与間隔 28日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8.15	
レジメン名	GS(3Weeks)療法					投与間隔 21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8	
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	60 mg/m ² /day	経口投与	1日2回 朝夕食後	day1から14日間	
レジメン名	nal-IRI+5-FU/l-LV(インフューザーポンプ使用)療法					投与間隔 14日
	イリノテカン(リポソーム製剤)	70 [*] mg/m ²	点滴静注	90分	day1	
						※以下のUGT1A1遺伝子多型を有する場合、イリノテカン(リポソーム製剤)の開始用量は50mg/m ²
						*6ホモ接合体、*28ホモ接合体、*6及び*28ダブルヘテロ接合体
	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間	day1-2	