

レジメン名	抗がん薬名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	投与間隔
レジメン名	アクテムラ点滴静注療法					28日
	トシリズマブ	8 mg/kg	点滴静注	1時間	day1	
レジメン名	オレンシア皮下注(day1点滴・皮下注併用)療法					投与間隔
	アバタセプト	500(60kg未満) mg/body 750(60kg以上100kg以下) mg/body 1000(100kg以上) mg/body	点滴静注	30分	day1	
	アバタセプト	125 mg/body	皮下注			点滴後、同日中に投与。以後1週間毎
レジメン名	オレンシア点滴静注療法					投与間隔
	アバタセプト	500(60kg未満) mg/body 750(60kg以上100kg以下) mg/body 1000(100kg以上) mg/body	点滴静注	30分	day1.15.29 以後4週間隔	
レジメン名	レミケード(メトトレキサート)療法					投与間隔
	インフリキシマブ	3 mg/kg  ※投与4回目より効果不十分又は効果が減弱した場合には、投与量の増量や投与間隔の短縮が可能。(段階的に行うこと) ※投与量の上限 8週間間隔:10mg/kg 投与間隔を短縮(最短投与間隔は4週):6mg/kg	点滴静注	初回~3回目:2時間 以降:1時間	day1.15.43 以降8週毎投与	※1時間あたり5mg/kgを投与する速度を超えない ※最短4週間の間隔で投与(6mg/kg)
	メトトレキサート	6~16mg(適宜増減)/週	経口投与			